ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

sombrero, máscara, overol, guantes y botas. No coma, manejo del trabajo. Báñese con abundante agua y jabón contacto en los ojos y tracto respiratorio produce ligera heridas abiertas en la piel. La ingestión puede causar

E CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO"
ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O

EL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
ESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE

EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA

NTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PERSONA CON EL MÉDICO"

PRIMEROS AUXILIOS

s ojos, lave con abundante agua durante 15 minutos. En e vómito inmediatamente. Si el paciente esta inconciente e inhalación coloque a la persona en un lugar ventilado y ontacto con los ojos o heridas en la piel, lave con agua

CACIÓN LLEVE EL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA"

sintomático. No existe antecedentes de intoxicación producto.

AS DE PROTECCION AL AMBIENTE

NDACIONES DE USO DEL PRODUCTO".
CÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A ABLECIDAS EN SU LOCALIDAD".
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS".
ENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EN SUELOS, RIOS, LAGOS U OTROS CUERPOS DE

EPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO".
SUELOS ARENOSOS O TERRENOS CERCANOS A S O CON MANTOS DE AGUA SOMEROS, APLIQUE DE DADES DE NITRÓGENO DE SU CULTIVO Y DIVIDA EN ARA SU MÁXIMO APROVECHAMIENTO".
DUCTO ANTES DE UNA LLUVIA".

MAXIFRUIT

Fertilizante orgánico líquido

ANÁLISIS GARANTIZADO

	% p/p
Aminoácidos libres	2,00
Nitrógeno total (N)	6,00
Fósforo (P2O5)	12,00

RSCO 034/III/10

CONTENIDO NETO: VARIABLE
LOTE Nº: VARIABLE
FECHA FORMULACIÓN: VARIABLE
FECHA CADUCIDAD: 2 años después de la fecha de formulación.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PR

MAXIFRUIT es un fertilizante NP enriquecido con a efectivo en aquellos cultivos especialmente sensibles a que contiene además fitorreguladores. Su composicio potencia la floración y el cuajado y engorde de frutos.

INSTRUCCIONES DE USO

MAXIFRUIT está recomendado en todos los cultivos, clavel, col, col de bruselas, coliflor, cucurbitáceas como pepino, espinaca, guisante, lechuga, rosal, tabaco y trél por vía foliar mojando bien el envés de las hojas, con alto

SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN

DOSIS

CALABACÍN: en pulverización foliar, aplicar al apare 50-75cc/HL
cada semana. En riego por goteo aplicar 2L/Ha y repetir **PEPINO, PIMIENTO, JUDIA, TOMATE, MELÓN, y SA** aplicar 2L/Ha cada 10 -15 días.
FRESA y FRESÓN: en riego por goteo aplicar 2L/Ha cu color los primeros frutos. Repetir la aplicación de form hasta el final del cultivo.
OTRAS HORTALIZAS: Aplicar 1L/Ha y semana.
CÍTRICOS y FRUTALES: Aplicar 1L/Ha y mes dependien
OTROS CULTIVOS: Consultar con el departamento técni

Se aconseja aplicar vía foliar mojando bien el envés de alto grado de humedad.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR

Producto listo para aplicarse manual o mecánicament envase antes de usar **MAXIFRUIT**, abra con cuidado probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado e cantidad indicada de, mezcle en una cubeta la cantidad agua, agite, posteriormente agregue al tanque de aplicac y agite nuevamente.

ESTA ETIQUETA SOLO PARA USO INFORMATIVO NO PARA USO COMERCIAL

DISTRIBUIDO POR:
INSECTICIDAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
Carretera Internacional Km. 540
Zona Industrial Nº 2
C.P. 85000, Cd. Obregón, Sonora
RFC IPA 770124 JT2

HECHO EN ESPAÑA

KMXCUA0001